

Koirasi on siis saanut diagnoosiksi tyypillinen addisonin tauti

Suunnattu koirille jotka ovat Florinef/Fludrokortisoni/Astonin-H lääkityksellä (päivittäinen pilleri)

Kun koirasi saapuu kotiin:

- 1) Muista hengittää. Lääkittyinä koirat elävät pitkän ja normaalin elämän addisonista huolimatta. Lääkkeet tarvitsevat huolellista säätöä kunnes löydätte parhaan annoksen koirallesi.
- 2) Varmista että koirallesi on aina tarjolla vettä. Lääkitys toimii parhaiten, kun koira ei pääse kuivumaan. Kaikki pissavahingot ja vuotaminen poistuvat lääkkeiden säädöllä.
- 3) Koirasi ei välttämättä ole kiinnostunut ruuasta välittömästi. Hemmottele heitä vähärasvaisilla asioilla. Muutamia hyviä vaihtoehtoja ovat putsatut lihat, nahaton broileri, munakokkeli tai riisi. Voi ainakaan tutustuttaa heidät takaisin normaaliin ruokaansa. Saatat joutua vaihtamaan kupin, sillä osa koirista yhdistää vanhan kuppinsa sairaana oloon. Addisonikoirat eivät tarvitse erikoisruokavaliota, mutta vältä äärimmäisen rasvaisia ruokia.
- 4) Koirasi saattaa olla alussa väsynyt. Addisonin kriisistä toipuminen vastaa ihmisillä leikkauksesta toipumista. Kun lääkitys alkaa toimia, koirasi alkaa palata ennalleen. Anna koiran toimia oppaanasi. Aloita hitaasti paluu aktiviteettien pariin.
- 5) Laboratorio tuloksista kirjan pitäminen auttaa sinua seuraamaan edistystä. Voit myös pyytää kopiot eläinlääkärin muistiinpanoista. Ne ovat arvokkaita pitää varalla jos joskus joudut jostain syystä käymään toisella lääkärillä.

Päivittäin:

- 1) On suositeltavaa, että koirasi Florinef annos jaetaan kahdeksi annokseksi ja tarjoillaan ruuan kera. Suositeltava aloitusannos on 0,1mg/10lbs/5kg. Annosta tarvitsee useimmiten nostaa, joten säännöllinen elektrolyyttien seuranta on tärkeää.
- 2) Tarkista lääkkeen pakkauksesta tarvitseeko sitä säilyttää jääkaapissa. Osaa tarvitsee ja osaa ei.
- 3) Useimmat koirat jotka ovat näillä lääkkeillä eivät tarvitse erillistä glukokortikoidivalmistetta (esim. Prednisone, Prednisolone, Hydrokortisoni, Kortisoni asetaatti tai Medrol). Sitä on voitu silti määrätä edistämään kriisistä toipumista.

Ensimmäinen kuukausi:

- 1) Viikon kuluttua lääkityksen aloittamisesta testaa elektrolyytit "lyytit, jotka ovat natrium (Na) ja kalium (K) varmistaaksesi, että lääkeannos on riittävä.

- 2) Jatka testaamista viikottain kunnes optimaalinen lääkeannos on saavutettu.
- 3) Haluat natriumin olevan viitearvoissa, mutta ei liian matalalla. Kaliumin puolestaan haluat olevat viitearvojen puolivälissä. Viitearvot ovat numerot jotka kertovat mitkä arvot ovat normaaleja. Esimerkiksi Kalium 3.5-5.8 tarkoittaa, että kaliumia pidetään normaalina välillä 3.5 ja 5.8. Tässä esimerkissä, haluat kaliumin olevan 4.6-4.7. Jos kalium on tuota matalammalla Florinef-lääkeannosta voidaan pienentää. Jos taas kalium on tuota korkeammalla Florinef-lääkeannosta suurennetaan.

Seuraava kuukausi ja siitä eteenpäin:

- 1) Osa koirista tarvitsee edelleen lääkkeen nostamista. Jos koirasi vointi ei ole kohdallaan, tarkista elektrolyytit ja pyydä eläinlääkäriäsi tekemään tarvittavat muutokset.
- 2) Joka kerta kun annosta muutetaan katso elektrolyytit 5-7 päivän jälkeen varmistaaksesi, että muutos on vaikuttanut halutulla tavalla.
- 3) Sen jälkeen kun optimaalinen lääke annos on saavutettu, tarkista elektrolyytit 3-6 kuukauden välein.

Huomioi: Koska koirasi käyttää glukokortikoideja. Kipulääkkeet (kuten Rimadyl, Metacam, Meloxicam ja muut vastaavat) eivät ole turvallisia sillä ne saattavat johtaa munuaisvaurioon tai mahahaavaan. Niiden sijasta Prednisonia on yleensä käytetty tulehdusta hillitseväksi lääkkeeksi ja Tramadolina tai Gabapentiiniä kivulääkkeenä.

Koirille joilla on tyyppinen addisoni ei tulisi antaa Pedialyte tai Gatorade-tyyppisiä valmisteita koska ne sisältävät kaliumia.