

VOTRE CHIEN A ÉTÉ DIAGNOSTIQUÉ DE LA MALADIE D'ADDISON TYPIQUE

POUR LES CHIENS TRAITÉS AU FLORINEF/FLUDROCORTISONEASTONIN-H

(Médicaments quotidiens)

Quand votre chien est de retour à la maison:

- 1) Vous pouvez maintenant respirer. Les chiens atteints de la maladie d'Addison vivent normalement en autant que les médicaments sont administrés et que les dosages sont ajustés minutieusement afin d'atteindre l'optimisation de ces médicaments.
- 2) Assurez-vous qu'une gamelle d'eau fraîche est disponible en tout temps car l'hydratation est essentielle à l'absorption des médicaments. Les accidents d'urine ou de fuites seront résolus du moment où la posologie est ajustée et optimisée.
- 3) Au début, il est possible que votre chien démontre un manque d'intérêt pour la nourriture. Offrez des aliments qu'il préfère, en autant qu'ils sont faibles en matières grasses tels que, poitrine de poulet (sans peau), œufs brouillés, riz. Vous pourrez par la suite réintroduire graduellement la nourriture normale. Il est parfois nécessaire de changer les gamelles car certains chiens associent la nourriture ou les gamelles à la crise pré-diagnostic. Il n'existe pas de diètes spécialisées pour la maladie d'Addison sauf que nous suggérons d'éviter les aliments riches en matières grasses.
- 4) Votre chien pourrait également démontrer des signes de fatigue extrême. Pour un chien, se remettre d'une crise d'Addison est l'équivalent à un humain se remettant d'une chirurgie. Une fois que les médicaments commencent à faire effet, votre chien donnera des signes qu'il reprend graduellement des forces. Laissez-le vous guider et retournez aux activités et à l'exercice lentement et graduellement.
- 5) Établissez un dossier où vous garderez une copie de notes et résultats de tous les tests conduits par les vétérinaires traitants, ce qui vous permettra de suivre les progrès de votre chien. Si pour quelque raison vous devriez consulter un autre vétérinaire, ce dossier pourrait s'avérer indispensable.

Tous les jours:

- 1) Il est suggéré d'administrer le Florinef/Fludrocortisone/Astonin-H en 2 doses séparées à chaque jour, et ce, accompagné de nourriture. Le dosage de départ typiquement suggéré est 0.1mg pour chaque 10 livres de poids (ou 5 kilos). Il est fort probable que ce dosage devra être augmenté et c'est pour cette raison que nous suggérons des suivis très réguliers afin de mesurer les électrolytiques.
- 2) Le besoin de réfrigération varie selon les médicaments, donc nous vous suggérons de lire attentivement les instructions sur l'emballage de chacun de ces médicaments prescrits.

- 3) La majorité des chiens traités sous cette gamme de médicaments n'ont pas besoin de supplément de prednisone, prednisolone, hydrocortisone, cortisone acetate ou toute autre forme de glucocorticoid. Il est cependant fort possible que l'un de ces glucocorticoid soit prescrit afin d'aider à la récupération de votre chien suite à la crise d'Addison.

Le premier mois:

- 1) Après une semaine sous le dosage de départ du Florinef/Fludrocortisone/Astonin-H, nous suggérons une analyse sanguine afin de mesurer le sodium N ainsi que le potassium K, ainsi que pour vous assurer que le dosage est adéquat.
- 2) Nous suggérons de répéter les analyses sanguines à chaque semaine jusqu'au moment où vous constaterez que le dosage de médicaments est optimisé.
- 3) A cette fin, vous voulez viser un taux de sodium dans les limites de la marge de référence, sans pour autant éviter qu'il soit trop bas dans la marge. En ce qui concerne le potassium, idéalement le taux devrait tomber vers le milieu de la marge. Les marges de référence indiquent les valeurs normales, par exemple, une marge de 3.5 – 5.8 pourrait indiquer que le potassium est normal s'il tombe dans les limites de cette marge, mais idéalement, vous ciblez un taux de 4.6 ou 4.7. Dans le cas échéant, le dosage pourrait donc être réduit si le potassium est plus bas ou augmenté si le potassium est plus élevé.

Le deuxième mois et les mois à suivre:

- 1) Dû au fait qu'il est fort probable que le dosage initial de Florinef/Fludrocortisone/Astonin-H devra être augmenté, nous vous suggérons de demeurer aux aguets pour tous symptômes de malaises qui vous semblent anormaux pour votre chien. Si c'est le cas, on suggère une consultation auprès de votre vétérinaire afin de mesurer les électrolytiques pour déterminer s'il y a lieu d'un ajustement au dosage.
- 2) Suite à un changement de dosage, il est suggéré de refaire une autre vérification des électrolytiques en dedans de 5 à 7 jours, ce qui vous permettra de mesurer de l'efficacité du nouveau dosage.
- 3) Une fois que le dosage est optimisé, nous suggérons des suivis d'analyses sanguines aux 3 ou 6 mois.

A noter: Comme le Florinef/Fludrocortisone/Astonin-H contiennent un certain élément de glucocorticoid, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens tels que Rimadyl, Metacam, Meloxicam et autres sont à déconseiller car ils peuvent entraîner des lésions rénales ainsi que des ulcères d'estomac. La prednisone est généralement utilisée comme médicament anti-inflammatoire et le Tramadol ou la Gabapentine sont souvent utilisés pour la douleur.

Il est également suggéré d'éviter de donner le Pedialyte ou tous breuvages de type Gatorade aux chiens atteints de la maladie d'Addison typique.